

Omex Sequential 1

FUNZIONI

Azoto e fosforo sono particolarmente importanti per le colture durante le prime fasi vegetative. Le carenze di fosforo agisce negativamente nello sviluppo delle radici, la vigoria e la resa finale della coltura. Le colture, coltivate in terreni nutrizionalmente impoveriti o dove l'umidità del terreno impedisce un adeguato movimento dei nutrienti nella zona radicale, grazie al Sequential 1, riusciranno a superare i primi stadi fenologici. Omex Sequential 1 fornisce magnesio, che è spesso carente nelle colture coltivate su terreni sabbiosi e leggeri. Il magnesio insieme ad altri micro-nutrienti, è di vitale importanza per la clorofilla e la sintesi proteica.

DESCRIZIONE

Sospensione di concime NPK 10-40-20 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn) e zinco (Zn)



COMPOSIZIONE			P/P	P/V
Azoto		N	6.55%	10.00%
Fosforo		P ₂ O ₅	26.20%	40.00%
Potassio		K ₂ O	13.10%	20.00%
Magnesio		MgO	0.98%	1.50%
Ferro	(EDTA)	Fe	0.111%	0.17%
Manganese	(EDTA)	Mn	0.056%	0.085%
Rame	(EDTA)	Cu	0.056%	0.085%
Zinco	(EDTA)	Zn	0.056%	0.085%
Boro		B	0.023%	0.035%
Cobalto	(EDTA)	Co	0.0008%	0.0012%
Molibdeno		Mo	0.0008%	0.0012%
pH (soluzione al 10%)			4.0-5.0	
Peso specifico			1.51-1.55 @18°C	

PREPARAZIONE

L'irroratrice dev'essere riempita per metà della quantità di acqua necessaria. Misurare la quantità necessaria di Omex Sequential 1 ed aggiungerlo al serbatoio mantenendolo in costante agitazione. Aggiungere la rimanente acqua per correggere la diluizione.



OMEX
AGRIFLUIDS

www.omex.com

DILUIZIONE: Si consiglia 500-1500 litri per ettaro d'acqua.

Agitare bene prima dell'uso



Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	DOSE l/ha	APPLICAZIONI
Patate	6.0	Applicare 7-10 giorni dopo la formazione dei tuberi
Rose & Ornamentali	2.0-3.0	Trattamenti mensili su cultivar sempre verdi o durante la fase di accrescimento vegetativo con cadenza bisettimanale sulle altre.
Fragola	3.0	Applicazioni mensili su cultivar perenni. 2 applicazioni a 14 giorni d'intervallo
Fragole	3.0	Applicare a partire dalla terza settimana dopo il trapianto
Pomodoro e Peperone	2.0-3.0	Prima applicazione a 3 settimane dal trapianto. Le seguenti con cadenza bisettimanale
Ortaggi in serra o pieno campo	2.0-3.0	Da 1 a 2 applicazioni dall'inizio della fase vegetativa ed al fabbisogno necessario

COMPATIBILITÀ

Omex Sequential 1 è compatibile con la maggior parte, ma non tutti, i pesticidi, regolatori della crescita e micro-nutrienti. Tuttavia, Omex Agrifluids Ltd non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni in quanto non tutti i pesticidi sono stati testati e perché l'efficacia di qualsiasi miscela dipenderà, tra l'altro, dall'antiparassitario interessato, dalle condizioni delle colture, dalla fase di crescita, dalle condizioni meteorologiche e dai volumi d'acqua utilizzati

PRECAUZIONI

Omex Sequential 1 deve essere conservato in un luogo asciutto ed ad temperatura controllata; l'ottimale è compreso tra 5-40°C. Omex Sequential 1 è un concime fogliare non pericoloso e non infiammabile. Si consiglia sempre di usare guanti e maschera durante la manipolazione. In situazioni di stoccaggio prolungato potrebbe verificarsi una leggera sedimentazione delle particelle di nutrienti, ma attraverso una forte agitazione, Omex Sequential 1 tornerà alla propria soluzione iniziale.

IMBALLAGGIO: Omex Sequential 1 è disponibile nelle confezioni da 0.25L, 0.5L, 1L, 5L, 10L, 200L e 1000L.

OMEX
AGRIFLUIDS

Omex Agrifluids Limited
 Saddlebow Road • King's Lynn • Norfolk PE34 3JA • UK
 t: +44 (0)1553 817 500 • f: +44 (0)1553 817 501
 e: agrifluids@omex.com • www.omex.com